


# Synthroid®

(levothyroxine sodium tablets, USP)

SI SU DOCTOR RECETA SYNTHROID  
**ASEGÚRESE QUE  
RECIBE SYNTHROID**



**1 DE CADA 3  
PERSONAS  
PIENSA QUE ESTÁ  
EN SYNTHROID  
Y NO LO ESTÁ**



**PÍDALE A SU DOCTOR QUE  
ESCRIBA DAW-1 EN LA RECETA**  
indicando que el medicamento  
de marca es necesario. Así  
podría pagar el deducible  
más bajo en su Synthroid.

**12 OPCIONES DE  
DOSIFICACIÓN PRECISAS**

SI SUS PASTILLAS NO DICEN "SYNTHROID",  
NO SON SYNTHROID



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha determinado que ciertos productos de levotiroxina son intercambiables. Las drogas que se clasifican como intercambiables pueden ser sustituidas en la farmacia. **Un producto de levotiroxina que no es intercambiable con SYNTHROID podría no tener el mismo efecto de SYNTHROID en su hormona estimulante del tiroides (TSH).**

Verifique las pastillas al recibir su receta

Las tabletas no muestran el tamaño real y podrían no representar el color exacto.

## Uso

SYNTHROID® (levotiroxina sódica) en tabletas, para uso oral, es una hormona tiroidea sintética de venta con receta que se usa para tratar una enfermedad llamada hipotiroidismo. Su función es reemplazar una hormona que es producida normalmente por la glándula tiroidea. En general, el tratamiento de reemplazo tiroideo debe tomarse de por vida. SYNTHROID no debe usarse para tratar neoplasias benignas ni el aumento de tamaño de la glándula tiroidea en pacientes con niveles normales de yodo, ni en casos de hipotiroidismo temporal causado por la inflamación de la glándula tiroidea (tiroiditis).

## Información de Seguridad Importante

- **Las hormonas tiroideas, incluida SYNTHROID, no deben usarse solas ni en combinación con otros fármacos para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso. En pacientes con niveles normales de la hormona tiroidea, las dosis de SYNTHROID usadas diariamente para el reemplazo hormonal no son útiles para la pérdida de peso. Las dosis mayores pueden causar eventos graves o incluso potencialmente mortales, especialmente cuando se usan en combinación con ciertos fármacos que reducen el apetito.**
- No use SYNTHROID si tiene problemas en las glándulas suprarrenales sin corregir.
- El uso excesivo de levotiroxina se ha asociado con un aumento de la pérdida ósea, en especial en las mujeres después de la menopausia.
- Una vez que su médico haya determinado la dosis de SYNTHROID específica para usted, es importante que se haga análisis de laboratorio, según lo indique su médico, al menos una vez al año.
- Los alimentos como la harina de soya, la harina de semilla de algodón, las nueces y la fibra alimenticia pueden hacer que su organismo absorba menos SYNTHROID a través del tracto gastrointestinal. El jugo de toronjas puede hacer que su organismo absorba menos levotiroxina y puede reducir su efecto. Informe a su médico si consume estos alimentos, ya que es posible que deba ajustar su dosis de SYNTHROID.
- Use SYNTHROID solo como se lo indique su médico. Tome SYNTHROID como una dosis única, preferiblemente con el estómago vacío, entre media hora y una hora antes del desayuno.
- Los productos como los suplementos de hierro y calcio y los antiácidos pueden reducir la capacidad del cuerpo para absorber levotiroxina, por lo que SYNTHROID debe tomarse 4 horas antes o después de usar estos productos.
- Informe a su médico si está embarazada o amamantando, o si planea quedar embarazada mientras toma SYNTHROID. Es posible que durante el embarazo se deba aumentar su dosis de SYNTHROID.
- Pueden pasar varias semanas antes de que note una mejoría en sus síntomas.
- Informe a su médico sobre cualquier otro fármaco que esté usando, incluidos productos de venta con receta y de venta libre.
- Informe a su médico sobre cualquier otra enfermedad que pueda tener, especialmente cardiopatías, diabetes, trastornos de la coagulación y problemas de la glándula suprarrenal o la hipófisis. Es posible que deba cambiarse la dosis de otros fármacos que esté usando para controlar estas enfermedades mientras toma SYNTHROID. Si tiene diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre y/o de glucosa en orina, según lo indique su médico, e infórmele de inmediato sobre cualquier cambio. Si toma anticoagulantes, debe controlar con frecuencia su estado de coagulación sanguínea.
- Informe a su médico o dentista que está tomando SYNTHROID antes de someterse a cualquier procedimiento.
- Informe a su médico si desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolor en el pecho, dificultad para respirar, calambres en las piernas, dolor de cabeza, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso, vómitos, diarrea, sudoración excesiva, intolerancia al calor, fiebre, cambios en el período menstrual, protuberancias rojas en la piel (urticaria) o erupciones cutáneas, o cualquier otro evento médico inusual.
- Se puede producir una pérdida parcial del cabello durante los primeros meses al tomar SYNTHROID.

**Esta es la información de seguridad más importante que debe conocer acerca de SYNTHROID. Para obtener más información, hable con su médico.**

**Se le recomienda que informe sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos con receta a la FDA. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088).**

Si no puede costear su medicamento, comuníquese con [www.pparx.org](http://www.pparx.org)

Para la Información de Prescripción Completa visite [www.rxabbvie.com/pdf/synthroid\\_SPA.pdf](http://www.rxabbvie.com/pdf/synthroid_SPA.pdf)